

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 16 DEL 5 LUGLIO 2019

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino
ARPAV 05/07
h 13.00

Vicenza e pedemontana	venerdì 5 pom/sera	sabato 6 mattina	sabato 6 pom/sera	domenica 7 mattina	domenica 7 pom/sera	lunedì 8	martedì 9
stato del cielo							
temperatura	max 31/33 °C	min 20/22 °C max 32/34 °C		min 20/22 °C max 31/33 °C			
precipitazioni	Assenti	Assenti	Occasionali temporali	Piogge locali anche con rovesci/temporali	Rovesci o temporali locali	Qualche rovescio o temporale	Rovesci o temporali sparsi
probabilità precipitazioni	0%	0%	10%	10%	30%	50%	60%
attendibilità previsione		Ottima	Ottima	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta

Andamento meteo: Il periodo torrido è stato interrotto a metà settimana grazie all'afflusso di masse d'aria più fresca. Tali infiltrazioni hanno prodotto una forte instabilità pomeridiana/serale con temporali violenti che hanno interessato prevalentemente la zona pedemontana occidentale, i Lessini e i Berici settentrionali fino al confine con la provincia di Padova determinando ventate, scrosci di pioggia (35-60 mm tra martedì e mercoledì) e grandine, qua e là anche di grosse dimensioni, che hanno causato vari danni in via di accertamento. Altrove le piogge sono state ben inferiori e contenute entro una decina di millimetri mentre le temperature, dai 36-38°C di massima di giovedì 27 giugno, si sono abbassate ovunque di 4-6°C ma si mantengono ancora al di sopra dei valori normali del periodo.

Stato fenologico e culturale: Fase di ingrossamento ben avviato delle drupe (7-11 mm di lunghezza) in pianura-bassa collina e di primo ingrossamento in alta collina senza vistose variazioni rispetto alla scorsa settimana. I sopralluoghi effettuati in questi giorni confermano, purtroppo, la ridotta potenzialità produttiva stagionale degli impianti provinciali che riguarda anche quelli che non sono stati potati così come quelli che sono stati improduttivi anche lo scorso anno. La performance negativa sembra riguardare in particolare la varietà Leccino, penalizzata pure da una prima cascola fisiologica superiore al normale, ma anche altre come la Pendolino e la Maurino che solitamente sono più fertili mentre la Frantoio e la Rasara paiono un po' meglio, in generale. I casi di appassimento/avvizzimento delle drupe in accrescimento già segnalati nello scorso bollettino iniziano a notarsi più diffusamente. A breve i tecnici del TeSaF dell'Università di Padova entreranno in azione con la raccolta di campioni per eseguire le analisi e gli accertamenti del caso. Laddove sono pervenuti solo pochi mm di pioggia nei giorni scorsi si raccomanda di eseguire un'irrigazione di soccorso agli impianti nuovi/giovani per dare continuità allo sviluppo vegetativo delle piante e provvedere allo sfalcio dei cotici per ridurre la competizione idrica.

Stato parassitario: *Malattie fungine* – nulla di nuovo da segnalare. *Mosca* – è in corso di completamento l'installazione delle trappole di monitoraggio di *Dacus oleae* presso una ventina di aziende test nei 3 comprensori. *Cimice asiatica* - sono presenti diffusamente e in aumento le neanidi nei Berici-Lessini (1°-4° stadio giovanile) mentre sono basse ed occasionali in pedemontana.

Indirizzi di difesa: Nelle zone grandinate, laddove non si è provveduto rapidamente come da buona pratica, eseguire subito un trattamento con prodotti a base di rame per contrastare la proliferazione del batterio della Rogna. Per tutte le altre situazioni, il trattamento cautelativo insetticida-fungicida indicato la scorsa settimana è più che sufficiente per le esigenze del momento. **SC**

Prossimo bollettino Olivo: 12 luglio



cv Leccino -bassa collina (SC)



cv Frantoio -alta collina (SC)



Scarsissima allegazione su ramo produttivo (SC)



Cascola fisiologica e primi sintomi di avvizzimento (SC)



Necrosi sulle drupe in stadio più o meno avanzato (SC)



Trappola di monitoraggio per la mosca (SC)