

## BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 11 DEL 9 GIUGNO 2017

### CILIEGIO PEDEMONTANA e BERICI

|                              | Vicenza e pedemontana      | giovedì 8<br>pom/sera   | venerdì 9<br>mattina  | venerdì 9<br>pom/sera   | sabato 10<br>mattina  | sabato 10<br>pom/sera   | domenica 11   | lunedì 12   |
|------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVISIONI<br>prossimi 5 gg. | stato del cielo            |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | temperatura                | max 23/25 °C  | min 12/14 °C<br>max 27/29 °C  |   | min 15/17 °C<br>max 27/29 °C  |   |   |   |
|                              | precipitazioni             | Assenti   | Assenti   | Assenti   | Assenti   | Assenti   | Assenti   | Assenti   |
|                              | probabilità precipitazioni | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |
|                              | attendibilità previsione   |   | Ottima  | Ottima  | Ottima  | Ottima  | Ottima  | Ottima  |

Bollettino ARPAV  
aggiornato al 9  
giugno h 9.00

**Andamento meteo:** la prolungata fase di stabilità meteo è stata interrotta tra lunedì e martedì u.s da un fronte di masse d'aria fresca che ha portato delle piogge su tutto il territorio. Mediamente sono caduti da 5 a 10 mm. nei Berici e da 20 a 25 mm. in pedemontana mentre qua e là, in entrambi i comprensori, ci sono stati dei piovvaschi da 30-50 mm.

Le temperature sono scese di 3-4°C rispetto alla settimana scorsa attestandosi su valori massimi di 25-26°C in pedemontana e di 27-28°C nei Berici, in linea con le medie del periodo. Non si sono verificati eventi calamitosi.

**Stato fenologico e culturale:** maturazione commerciale delle cultivar tardive **Kordia** e **Ferrovia**. Sotto l'impulso delle alte temperature la progressione di fase è avanzata in modo assai celere in quest'ultimo periodo. Le raccolte, iniziate già nei primi giorni della settimana, sono proseguite senza interruzione anche per il timore della diffusione della drosifila e termineranno tra un paio di giorni nella maggior parte delle aziende. Le cariche produttive, generalmente contenute, hanno permesso comunque un ottimo sviluppo dei frutti e il raggiungimento di standard commerciali e qualitativi di riguardo anche nelle realtà produttive meno fertili e asciutte.

**Stato parassitario:** **Drosophila suzukii** – in quest'ultima settimana c'è stato un incremento delle presenze ovunque. Sulle varietà in maturazione negli impianti correttamente difesi (trattamenti + raccolta totale delle produzioni a perdere) non sono stati rilevati veri danni sui frutti (1-2% max.) mentre invece sono stati segnalati danni significativi (10-20% della produzione pendente) laddove c'è presenza e vicinanza di piante non trattate con frutti in surmaturazione. **Monilia** – Infezioni assenti.

**Indirizzi di difesa:** Al termine delle operazioni di raccolta provvedere, se non già eseguito, allo stacco totale delle produzioni rimaste in pianta e a perdere con conseguente stoccaggio o interrimento come da buone pratiche anti drosifila. **Per le varietà più tardive (Regina, Staccato ecc.) proseguire la difesa come da strategia programmata intervenendo ormai solo con Piretro (Asset, Pyganic ecc.) che ha un giorno di carenza.**

**Informazioni:** l'autorizzazione in deroga per l'uso del cyantraniliprole (Exirel 2017) su ciliegio, pesco, nectarine e vite da vino contro la Drosifila è stata data ieri, 8 giugno, con decreto del Ministero della Salute.

**Avvertenze:** Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le limitazioni d'uso. **SC**



Stadio cv. Kordia



Pupa e danno da Drosophila